



這些非處方藥物可以出售給需要抗生素的患者而不需要開具處方

## 請記住

- 過度使用抗生素會導致諸如MRSA的耐藥微生物的數量增加
- 抗生素可能導致嚴重的副作用
- 抗生素能夠與其他藥物相互作用，如：口服避孕藥
- 抗生素可能導致新的感染形成：例如：鵝口瘡或艱難梭菌。

請參閱 [www.ggcformulary.scot.nhs.uk/](http://www.ggcformulary.scot.nhs.uk/) 以獲取 成人感染處理的指導準則



您的症狀:	
喉嚨痛 <input type="checkbox"/>	支氣管咳嗽 <input type="checkbox"/>
感冒或流感 <input type="checkbox"/>	黏膜炎 <input type="checkbox"/>
乾咳 <input type="checkbox"/>	耳疼 <input type="checkbox"/>
其他 _____ <input type="checkbox"/>	

在非必要的情況下使用抗生素是對您無益的。

這是因為：

- 大多數感染只會持續數天，並且在無需使用抗生素的情況下就可以自愈。
- 許多感染是由病毒導致的。而抗生素並不能殺滅病毒。

在非必要的情況下使用抗生素可能是有害的。

因為：

- 抗生素可能導致副作用。
- 抗生素可能會使其他藥物作用失效。
- 抗生素可能導致新的感染形成。

在非必要的時候使用抗生素可能會使它們在將來失去效能。這就是通常所說的抗生素耐藥性。

### 實用建議

- 休息
- 多飲水

您的社區藥劑師會給您提供治療對策以幫助您緩解症狀。

如果您在幾天後仍覺不適，請致電或訪問醫生以獲得專業的建議。